

Vedlegg 3: Spørreskjemaer

Henrik Lindhjem, Kristin Magnussen, Ståle Navrud og Petter Gudding

VISTA ANALYSE AS




Spørreskjemaer

- Oslofjordversjonen
- Deler av skjemaet som var forskjellig for de tre andre casene
 - o Vestlandet nord (utslipp nord for Sognefjorden)
 - o Vestlandet sør (utslipp sørvest for Bergen)
 - o Lofoten/Vestfjorden

YTRE OSLOFJORD- VERSJONEN

panel



TESTMODE


qA
Er du...

- ☒ Mann
☐ Kvinne



NORSTAT
anything you need to know

Powered by Confrontit




TESTMODE

qB

Hvilket år er du født?

Velg et alternativ ▾






TESTMODE

NOZipcode

Hva er postnummeret der du bor?






TESTMODE

q1

Hvor viktig synes du følgende samfunnsoppgaver er?

	Svært viktig	Ganske viktig	Verken viktig eller uviktig	Ganske uviktig	Ikke viktig i det hele tatt	Usikker/vet ikke
Forbedre eldreomsorgen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Redusere utslipp av klimagasser	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bedre utdanningstilbudet i grunnskolen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Bygge nye veier	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Øke oljevernberedskapen langs kysten	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Redusere sykehuskøene	☐	☐	☐	☐	☐	☐





TESTMODE

q2

I denne undersøkelsen skal vi se spesielt på tiltak mot oljeutslipp fra skipsulykker i Oslofjordområdet, det vil si havet og kysten fra Oslo til Telemark i sørvest og Østfold i sørøst (se kartet nedenfor).


Oslofjorden



Omtrent hvor langt er det fra sjøen (saltvann) i luftlinje til din bolig?

- ☐ 0-500 meter
- ☐ 500 – 999 meter
- ☐ 1- 3 kilometer
- ☐ 4 - 9 kilometer
- ☐ 10-29 kilometer
- ☐ 30-59 kilometer
- ☐ 60-99 kilometer
- ☐ 100-200 kilometer
- ☐ Mer enn 200 kilometer
- ☐ Usikker/vet ikke






TESTMODE

q3

Har du (dvs. eier eller disponerer) hytte i Oslofjord-området (som ble vist på kartet)?

- ☐ Ja, har hytte langs kysten sørvest for Oslo
- ☐ Ja, har hytte langs kysten sørøst for Oslo
- ☐ Nei, har hytte på kysten, men ikke på denne strekningen
- ☐ Nei, har ikke hytte ved kysten
- ☐ Usikker/vet ikke






TESTMODE

q4

Har du de siste 12 månedene benyttet Oslofjord-området til noen av de følgende fritidsaktivitetene?

- ☐ Surfing, padling eller dykking
- ☐ Fotografering eller maling
- ☐ Fritidsfiske fra båt
- ☐ Kikke på fugle- og dyreliv
- ☐ Fritidsfiske med stang fra land
- ☐ Gå turer eller jogge langs sjøen
- ☐ Båttur (uten å fiske)
- ☐ Sanke skjell, tang eller fange krabber
- ☐ Jakt på sjøfugl og sel
- ☐ Bading
- ☐ Andre aktiviteter; i tilfelle hva
- ☐ Ingen aktivitet
- ☐ Vet ikke





TESTMODE


q5

Omtrent hvor mange dager de siste 12 månedene benyttet du Oslofjord-området til disse fritidsaktivitetene?

Du kan regne en aktivitet som varte én time eller mer som én dag. Om du gjorde flere aktiviteter samme dag teller dette kun som én dag

- ☐ 1-5 dager
- ☐ 6-15 dager
- ☐ 16-30 dager
- ☐ 31-50 dager
- ☐ 51-100 dager
- ☐ Flere enn 100 dager
- ☐ Usikker/vet ikke





TESTMODE

q6

Oljeutslipp fra skipsulykker

Nedenfor er det listet opp noen skipsulykker de siste årene som har gitt oljeutslipp. Kan du huske å ha hørt om noen av dem?

Navn på skip - Hvor og når skipsulykken skjedde

	Ja	Nei	Usikker/ vet ikke
Server: Utenfor Fedje, nord for Bergen i 2007	☐	☐	☐
Rocknes: Vatløstraumen, sør for Bergen i 2004	☐	☐	☐
Prestige: Kysten av Spania og Portugal i 2002	☐	☐	☐
Green Ålesund: Utenfor Haugesund i 2000	☐	☐	☐
Exxon Valdez : Kysten av Alaska i 1989	☐	☐	☐
Full City : Utenfor Langesund sommer 2009	☐	☐	☐
Godafoss: Utenfor Hvaler ved Fredrikstad 2011	☐	☐	☐



0%

25%

50%

75%

100%

TESTMODE

i7

Bildet nedenfor viser et eksempel på et skip som har gått på grunn, og der oljen samles opp ved bruk av lenser.



Skipet Full City på grunn utenfor Langesund 2009



0%

25%

50%

75%

100%

TESTMODE

q8

Hvis det ikke settes inn flere tiltak for å styrke oljevernberedskapen, mener eksperter at det vil skje en skipsulykke med oljeutslipp som gir miljøskade i Ytre Oslofjord-området de nærmeste årene.

Et slikt utslipp vil påvirke dyre- og plantelivet (se bildene nedenfor), og redusere mulighetene for friluftsliv i en periode. De to fugleartene lomvi og ærfugl er vist spesielt fordi de er sårbare arter. Fisk klarer oftest å svømme unna utslippet.

Lomvi



Ærfugl



Steinkobbe (selart)



Blåskjell



Krabbe



Tareskog



Hvor godt vil du si at du kjenner til plante- og dyrelivet på kysten av Oslofjord-området?

Ikke i det hele
tatt

Lite



Middels



Ganske godt



Meget godt



0%

25%

50%

75%

100%

TESTMODE

i9a

Olje som slippes ut vil både flyte på sjøen, blandes i vannet og kunne drive på land. Det vil påvirke hvor fint det er å bade, være ute i båt, gå tur og gjøre andre aktiviteter. Bildene nedenfor er eksempler fra området.

Strand



Strand/båter



Svaberg



Kystbebyggelse




Båtliv



Fritidsfiske





TESTMODE

q9

Bildene nedenfor fra tidligere utslipp viser noen eksempler på hvordan kysten kan påvirkes.



Har du personlig opplevd skader fra oljeutslipp på nært hold langs norskekysten, for eksempel ved at du har sett olje på stranda, oljeklumper i vannet, død eller skadet fugl eller lignende?

Ja	Nei	Vet ikke
☐	☐	☐



Miljøskader i Ytre Oslofjord med og uten tiltak

Tabellen viser dagens miljøtilstand i Ytre Oslofjord (i grønt) og hvordan miljøet kan ta skade som følge av oljeutslipp fra en skipsulykke. Skal dagens tilstand bevares er det nødvendig å innføre ulike tiltak.

Vi vil gjerne vite hva det er verdt for deg og din husstand å unngå disse miljøskadene.

Bruk gjerne litt tid på å lese tabellen.

	Med tiltak	Uten tiltak			
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl Fuglebestandene i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning I alt 1000 døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter 1 år I alt 7 500 døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 2 år I alt 20 000 døde fugl	Bestanden av ærfugl og lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 4 år I alt 50 000 døde fugl
Skade på sel					
	Del av området er viktig for sel. Selbestandene i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt 10 døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt 40 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter 2 år I alt 150 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokalt</u> utrydningstruet I alt 300 døde sel
Skade på kystsone					
	Området er svært viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har stort kaldtvannskorallrev, rike ålegressenger og verdifullt naturmiljø	5 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 6 måneder	30 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 1 år	150 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 3 år	400 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 5 år
Skadet på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat etter 1 år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 3 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 5 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket



TESTMODE

q10

Hvilke av disse fire typene miljøskader er viktigst for deg?

Rangér skadene på fugl, sel, på kystsone og på livet ellers i sjøen. Dra bildene over i boksene i den rekkefølgen som er viktigst for deg. Du kan flytte på bildene etter at de er plassert.

Skade på fugl



Skade på sel



Skade på kystsone



Skade på annet liv i sjøen



1	
2	
3	
4	




q10b

Kartet nedenfor viser et område i Ytre Oslofjord der det er mye skipstrafikk, og et mulig ulykkespunkt er vist som en rød prikk. Sirklene/skraveringen viser hvor langt oljen kan spre seg.

Spredning av olje som gir liten, middels, stor og svært stor miljøskade

Viktige områder for biologisk mangfold

Viktige friluftsområder



Har du de siste 12 månedene benyttet noen av områdene markert på kartet som ville bli skadet av dette oljeutslippet til fritidsaktiviteter?

Du kan krysse av for flere alternativer

- ☐

Ja, berørt område for liten miljøskade
- ☐


Ja, berørt område for middels miljøskade
- ☐

Ja, berørt område for stor miljøskade
- ☐

Ja, berørt område for svært stor miljøskade
- ☒

Nei, har ikke benyttet noen av de berørte områdene





TESTMODE

i11a

Du er nå kommet til den viktigste delen av undersøkelsen. Vi vil gjerne at du er litt ekstra grundig når du svarer på denne delen.





TESTMODE

i11

Kystverket vurderer nå flere tiltak for å styrke oljevernberedskapen. Det er både tiltak som forebygger skipsulykker som gir oljeutslipp og tiltak som forhindrer spredning av olje hvis utslipp likevel skulle skje.

Tenk deg nå at uten nye tiltak vil det skje en utslippshendelse i Ytre Oslofjord de nærmeste årene som kan forårsake enten liten, middels, stor eller svært stor miljøskade. Tiltakene vil kunne unngå disse miljøskadene.

Vi ønsker at du tenker igjennom hva det er verdt for deg og din husstand å unngå hvert enkelt av de fire skadenivåene. Du vil nå bli spurt om de fire skadenivåene etter tur. Vi starter med den lille miljøskaden

Din mening er viktig for Kystverkets vurdering av hvor stor tiltakspakke som skal velges.



i12x


Liten miljøskade

Tenk deg først at uten nye tiltak, vil det i løpet av de nærmeste årene skje ett skipsuhell med oljeutslipp som forårsaker liten miljøskade i Ytre Oslofjord-området. Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne miljøskaden som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak	Uten tiltak			
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl Fuglebestandene i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning I alt 1000 døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter 1 år I alt 7 500 døde fugl	Bestanden av sjøfugl lokal utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 2 år I alt 20 000 døde fugl	Bestanden av sjøfugl og lokal utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 4 år I alt 50 000 døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt 10 døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt 40 døde sel	Bestanden av seltypen steinribbe tilbake til normalt nivå etter 2 år I alt 150 døde sel	Bestanden av seltypen steinribbe lokal utryddingstruet I alt 300 døde sel
Skade på kystsoner					
	Området er svært viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har stort kaldtvannskorallrev, rike ålegressenger og verdifullt naturmiljø	5 km kystsoner bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 6 måneder	30 km kystsoner bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 1 år	150 km kystsoner bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 3 år	400 km kystsoner bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Vil påvirke landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 5 år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skaldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat etter 1 år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skaldyr, skjell og tang ikke spises før 1 år etter utslipp Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skaldyr, skjell og tang ikke spises før 5 år etter utslipp Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir liten miljøskade

- Viktige områder for biologisk mangfold
- Viktige friluftsområder





TESTMODE

q12

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én liten miljøskade i Ytre Oslofjord?

Næringslivet, skipsfarten, staten og husstandene drar alle nytte av skipstrafikken, og alle parter må derfor betale for tiltakene som gjør at man unngår miljøskader fra oljeutslipp. Alle husstander i regionen må dekke sin del av kostnadene gjennom økt inntektsskatt som går uavkortet til Kystverket for å bedre oljevernberedskapen.

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for å gjennomføre tiltak slik at man unngår en liten miljøskade i Ytre Oslofjord? Husk at dersom husstanden din betaler for dette, blir det mindre penger igjen å bruke på andre ting.

Tenk på hva det er verdt for deg og din husstand å unngå én liten miljøskade i Ytre Oslofjord-området

I glideskalaen nedenfor, velg det høyeste beløpet, om noe, din husstand helt sikkert er villig til å betale per år i 10 år.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

A horizontal slider bar with a green arrow pointing to the left, indicating a selection on the scale.





TESTMODE

q12B

Hva er den viktigste grunnen til at du oppga at din husstand ikke er villig til å betale noe for å unngå miljøskader fra oljeutslipp eller ikke vet hvilket beløp du skal oppgi?

Kryss av for den grunnen som var viktigst for deg.

- ☒ Dagens beredskap er bra nok
- ☐ Det var for vanskelig å komme fram til et beløp
- ☐ Skattenivået er allerede høyt nok
- ☐ Min husstand har ikke råd til å betale for dette
- ☐ Jeg ville betalt for tiltak i andre kystområder
- ☐ Jeg føler det ikke er riktig å veie miljøet i penger
- ☐ Hva jeg sier vil ikke påvirke om tiltakene gjennomføres eller ikke
- ☐ Det er rederiene og skipsnæringen som bør betale
- ☐ Jeg mener andre samfunnsoppgaver bør prioriteres først
- ☐ Jeg stoler ikke på at pengene vil gå til det riktige formålet
- ☐ Jeg tror ikke det vil skje oljeutslipp i dette kystområdet
- ☐ Jeg mener at penger kan omfordeles eller brukes mer effektivt
- ☐ Jeg vil ikke betale før jeg vet hva det koster
- ☐ Andre grunner, spesifiser:
- ☐ Usikker/ vet ikke




Middels miljøskade


Tenk deg nå istedenfor at uten tiltak vil det skje ett skipsuhell med oljeutslipp som gir middels miljøskade i Ytre Oslofjord-området, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak		Uten tiltak		
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl Fuglebestandene i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning I alt <u>1000</u> døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter <u>1</u> år I alt <u>7 500</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokal</u> utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>2</u> år I alt <u>20 000</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl og lom <u>lokal</u> utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>4</u> år I alt <u>50 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt <u>10</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt <u>40</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter <u>2</u> år I alt <u>150</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokal</u> utryddingstruet I alt <u>300</u> døde sel
Skade på kystzone					
	Området er svært viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har stort kaldtvannskorallrev, rike ålegressenger og verdifullt naturmiljø	<u>5</u> km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skaldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat etter <u>1</u> år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skaldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skaldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir middels miljøskade

- Viktige områder for biologisk mangfold
- Viktige friluftsområder





TESTMODE

q13

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én middels miljøskade i Ytre Oslofjord?


Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én middels miljøskade i Ytre Oslofjord?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor; ikke i tillegg til, beløpet du oppga tidligere for å unngå liten miljøskade.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------





TESTMODE

q13

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én middels miljøskade i Ytre Oslofjord?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én middels miljøskade i Ytre Oslofjord?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor; ikke i tillegg til, beløpet du oppga tidligere for å unngå liten miljøskade.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------


A horizontal slider bar with a light blue background. A green marker with a white outline is positioned at the 1000 mark on the scale.

i13

Tilsvare totalt i 10 år:

1000 kroner





TESTMODE

q13

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én middels miljøskade i Ytre Oslofjord?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én middels miljøskade i Ytre Oslofjord?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor; ikke i tillegg til, beløpet du oppga tidligere for å unngå liten miljøskade.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

i13

Tilsvarer totalt i 10 år:

Tallet må være høyere enn 15000 kroner

q13num

Vennligst angi beløp over 15000:




Tenk deg nå at dersom det ikke gjennomføres tiltak skjer det istedenfor et skipsuhell med oljeutslipp som gir stor miljøskade i Ytre Oslofjord-området.


Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne miljøskaden, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak			Uten tiltak	
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl Fuglebestandene i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning I alt <u>1000</u> døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter <u>1</u> år I alt <u>7 500</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokalt</u> utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>2</u> år I alt <u>20 000</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl og andre sjøfugl <u>lokalt</u> utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>4</u> år I alt <u>50 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt <u>10</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt <u>40</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter <u>2</u> år I alt <u>150</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokalt</u> utryddingstruet I alt <u>300</u> døde sel
Skade på kystsone					
	Området er svært viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har stort kaldtvannskorallrev, rike ålegressenger og verdifullt naturmiljø	<u>5</u> km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat etter <u>1</u> år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir stor miljøskade

- Viktige områder for biologisk mangfold
- Viktige friluftsområder





TESTMODE


q14

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én stor miljøskade i Ytre Oslofjord?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én stor miljøskade i Ytre Oslofjord?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor de beløpene du oppga tidligere.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:



i14

Tilsvarer totalt i 10 år:

1000 kroner




Svært stor miljøskade

Tenk deg nå istedenfor at dersom det ikke gjennomføres tiltak skjer det ett skipsuhell med oljeutslipp som gir svært stor miljøskade i Ytre Oslofjord-området. Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne ene miljøskaden, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak				Uten tiltak
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl Fuglebestandene i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning I alt <u>1000</u> døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter <u>1</u> år I alt <u>7 500</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokal</u> t utrydningstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>2</u> år I alt <u>20 000</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl og lomvi <u>lokal</u> t utrydningstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>4</u> år I alt <u>50 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt <u>10</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt <u>40</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter <u>2</u> år I alt <u>150</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokal</u> t utrydningstruet I alt <u>300</u> døde sel
Skade på kystzone					
	Området er svært viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har stort kaldt vannskorallrev, rike ålegressenger og verdifullt naturmiljø	<u>5</u> km kystzone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystzone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystzone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystzone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat etter <u>1</u> år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir svært stor miljøskade

- Viktige områder for biologisk mangfold
- Viktige friluftsområder





TESTMODE

qNew

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én svært stor miljøskade i Ytre Oslofjord?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én svært stor miljøskade i Ytre Oslofjord?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor de beløpene du oppga tidligere.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

A horizontal slider bar with a green arrow pointing to the value 25. The bar is light blue and has a thin grey line running through it.

iNew

Tilsvare totalt i 10 år:

250 kroner





TESTMODE


q15

Hva er den viktigste grunnen til at du oppga at din husstand er villig til å betale noe for å unngå miljøskader fra oljeutslipp?

Kryss av for den grunnen som var viktigst for deg

- ☐ Jeg oppga et beløp på størrelse med det min husstand pleier å gi til veldedige formål
- ☒ Min husstand er villig til å betale for alle gode miljøformål
- ☐ Jeg oppga et positivt beløp fordi jeg ikke tror beløpet blir krevd inn uansett
- ☐ Jeg følte en forpliktelse til å betale fordi alle andre husstander også skal bidra
- ☐ Jeg er villig til å betale fordi jeg har sympati med de som bor nært kysten
- ☐ Jeg er opptatt av å bevare naturen uavhengig av min egen bruk
- ☐ Godt kystmiljø øker min opplevelsesverdi av å ferdes ved kysten
- ☐ Andre grunner, spesifiser:
- ☐ Usikker/ vet ikke





TESTMODE

q18

Hvor viktig var de ulike delene av miljøskaden for deg da du oppga din betalingsvillighet for de fire skadestørrelsene?

	Svært viktig	Ganske viktig	Verken viktig eller uviktig	Ganske Uviktig	Ikke viktig i det hele tatt	Usikker/vet ikke
Døde fugler	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hvordan oljen påvirker friluftslivet	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Om sel og fugl ble lokalt utrydningstruet	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Døde sel	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Sårbarheten til økosystemet	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hvor lang tid det tar før området kan brukes som før	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Hvor lang tid det tar før det er trygt å spise sjømat	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Antall km kystlinje som synlig påvirkes av oljen	☐	☐	☐	☐	☐	☐
Skader på livet i havet generelt	☐	☐	☐	☐	☐	☐



q11

Tiltakene Kystverket vurderer både forebygger skipsulykker som gir oljeutslipp og forhindrer spredning av olje hvis utslipp likevel skulle skje (se nedenfor).

Hvilke to tiltak tror du mest effektivt kan hindre at en får miljøskader av oljeutslipp fra skipsulykker?

Velg maksimalt to tiltak



Bedre trafikkovervåking og -regulering




Økt bruk av los



Vet ikke



Flere lagre med oljevernustyr



Bedre merking av skipsledene



Flere slepebåter



Lenser for dårlig vær



Oljevernustyr på rutebåter



Fjerning av skjær




Promilletesting av mannskap



Bedre opplæring av personell






TESTMODE

q19

I hvilken grad tror du at Kystverket vil bruke resultatene fra denne undersøkelsen når de bestemmer hvor omfattende tiltak de skal sette i verk mot oljeutslipp i Ytre Oslofjord-området?

- ☐ I svært stor grad
- ☐ I stor grad
- ☐ Verken i stor eller liten grad
- ☐ I liten grad
- ☐ I svært liten grad
- ☐ Vet ikke






TESTMODE

q20

Hvor sikkert tror du det er at din husstand må betale økt skatt de neste 10 årene dersom det blir gjennomført nye tiltak mot oljeutslipp i Ytre Oslofjord-området?

- ☐ Helt sikkert
- ☐ Ganske sikkert
- ☐ Ganske sikkert ikke
- ☐ Helt sikkert ikke
- ☐ Vet ikke






TESTMODE

q21

Hvor sikkert tror du det er at Kystverkets tiltak kan unngå miljøskadene vi har beskrevet?

- ☐ Helt sikkert
- ☐ Ganske sikkert
- ☐ Ganske sikkert ikke
- ☐ Helt sikkert ikke
- ☐ Vet ikke






TESTMODE

q22a

Tenk deg at det skjedde et oljeutslipp fra skip og du var i nærheten. Ville du bidratt med frivillig innsats for å hjelpe til med oppryddingen?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Vet ikke





TESTMODE

q22b

Hva er årsaken til at du ikke ville eller ikke visste om du ville bidratt?

- ☐ Det er ikke mitt ansvar
- ☐ Det er helsefarlig
- ☐ Det monner lite med innsats fra privatpersoner
- ☐ Andre årsaker; beskriv hva:
- ☒ Usikker/ vet ikke





TESTMODE


q7

Er det noen områder langs norskekysten der du mener det er spesielt viktig å unngå skader på naturmiljøet fra oljeutslipp?

☐ Oppgi navn og type område

- ☐ Mener ingen områder er spesielt viktige
- ☐ Mener alle områder er like viktige
- ☐ Usikker/ vet ikke





TESTMODE


q24

Tenk deg at det skjedde et utslipp som gir stor miljøskade i et område av kysten du bruker mest. Hva ville du da gjøre?

Velg det alternativet som best dekker det du ville gjøre.

- ☐ Jeg ville fortsette å bruke kystområdet mens området var forurenset
- ☐ Jeg ville dra til et annet kystområde istedenfor mens området var forurenset
- ☐ Jeg ville ikke dra til et annet kystområde, men vente til området igjen ble rent
- ☐ Jeg ville dra til en elv eller innsjø istedenfor mens området var forurenset
- ☐ Jeg ville aldri bruke dette kystområdet igjen selv om oljesølet ble ryddet opp
- ☐ Vet ikke






TESTMODE

q24x

Hvor enig eller uenig er du i at det bør åpnes for oljeboring utenfor Lofoten?

1 Svært uenig	2	3	4	5	6	7	8	9	10 Svært enig






TESTMODE

INFO_bakgrunn

Helt til slutt ber vi deg om å oppgi noe bakgrunnsinformasjon om deg og din husstand.






TESTMODE

q25

Er du medlem i en miljøorganisasjon?

- ☐ Ja
- ☐ Nei
- ☐ Usikker/ vet ikke






TESTMODE

q26

Hva er ditt høyest fullførte utdanningsnivå?

- ☐ Grunnskole
- ☐ Ungdomsskole
- ☐ Videregående skole/gymnasium
- ☐ 3-4 årig universitetsutdanning (bachelor/cand.mag.)
- ☐ 5-årig universitetsutdanning (mastergrad e.l.)
- ☐ PhD/Doktorgrad
- ☐ Usikker/ vet ikke





TESTMODE

q27

Arbeider du eller andre i din husstand i noen av de følgende næringene?

Kryss av for de alternativer som passer.

- ☐ Skjell- og fiskeoppdrett
- ☐ Næringsfiske
- ☐ Petroleumssektoren
- ☐ Turistnæringen
- ☐ Skipsfart
- ☒ Ingen i min husstand jobber i noen av næringene ovenfor





TESTMODE

q28

Hva vil du anslå er din samlede brutto disponible inntekt per år? Det vil si din egen inntekt før skatten er trukket fra.

700 001 - 800 000 kroner ▼





TESTMODE

q29

Hva vil du anslå er husstandens samlede brutto disponible inntekt per år? Det vil si all samlet inntekt i husstanden før skatt er trukket fra.

1 500 001 - 1 600 000 kroner ▼



0%

25%

50%

75%

100%

TESTMODE

qEnd

Da er vi ferdige - er det noe annet du ønsker å si om undersøkelsen eller temaet vi har vært gjennom?



SKJEMAVERSJONENE FOR
VESTLAND NORD
VESTLAND SØR
LOFOTEN/VESTFJORDEN


I denne undersøkelsen skal vi se spesielt på tiltak mot oljeutslipp fra skipsulykker utenfor Vestlandskysten, dvs. hav- og kystområdene utenfor Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal (se kartet nedenfor).

Vestlandskysten



Omtrent hvor langt er det fra sjøen (saltvann) i luftlinje til din bolig?

- ☐ 0-500 meter
- ☐ 500 – 999 meter
- ☐ 1- 3 kilometer
- ☐ 4 - 9 kilometer
- ☐ 10-29 kilometer
- ☐ 30-59 kilometer
- ☐ 60-99 kilometer
- ☐ 100-200 kilometer



TESTMODE


q3

Har du (dvs. eier eller disponerer) hytte ved Vestlandskysten (i fylkene Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal)?

- ☐ Ja, har hytte langs kysten av Hordaland
- ☐ Ja, har hytte langs kysten av Sogn og Fjordane
- ☐ Ja, har hytte langs kysten av Møre og Romsdal
- ☐ Nei, har hytte på kysten, men ikke på denne strekningen
- ☐ Nei, har ikke hytte ved kysten
- ☐ Usikker/vet ikke



Ikke i det hele tatt	Lite	Middels	Ganske godt	Meget godt
				



TESTMODE

i9a

Olje som slippes ut vil både flyte på sjøen, blandes i vannet og kunne drive på land. Det vil påvirke hvor fint det er å bade, være ute i båt, gå tur og gjøre andre aktiviteter. Bildene nedenfor er eksempler fra området.



Miljøskader på Vestlandskysten med og uten tiltak

Tabellen viser dagens miljøtilstand på Vestlandskysten (i grønt) og hvordan miljøet kan ta skade som følge av oljeutslipp fra en skipsulykke. Skal dagens tilstand bevares er det nødvendig å innføre ulike tiltak.

Vi vil gjerne vite hva det er verdt for deg og din husstand å unngå disse miljøskadene.

Bruk gjerne litt tid på å lese tabellen.

	Med tiltak	Uten tiltak			
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning I alt 1500 døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter 1 år I alt 12 500 døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokal</u> utrydningstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 2 år I alt 30 000 døde fugl	Bestanden av ærfugl og lom vi <u>lokal</u> utrydningstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 4 år I alt 70 000 døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt 30 døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt 100 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter 2 år I alt 300 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokal</u> utrydningstruet I alt 500 døde sel
Skade på kystsone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har verdifullt naturmiljø	5 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 6 måneder	30 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 1 år	150 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 3 år	400 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 5 år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat etter 1 år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 3 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 5 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

0%

25%

50%

75%

100%

TESTMODE

q10

Hvilke av disse fire typene miljøskader er viktigst for deg?

Rangér skadene på fugl, sel, på kystzone og på livet ellers i sjøen. Dra bildene over i boksene i den rekkefølgen som er viktigst for deg. Du kan flytte på bildene etter at de er plassert.

Skade på fugl



Skade på sel



Skade på kystzone



Skade på annet liv i sjøen



1

2

3

4



q10b

Kartet nedenfor viser et område utenfor Florø, området mellom Ytre Sula og Bremanger – eller sagt på en annen måte: sør for Nordfjord og nord for Sognefjorden; der det er mye skipstrafikk, og et mulig ulykkespunkt er vist som en rød prikk. Sirklene/skraveringen viser hvor langt oljen kan spre seg.

Spredning av olje som gir liten, middels, stor og svært stor miljøskade



Har du de siste 12 månedene benyttet noen av områdene markert på kartet som ville bli skadet av dette oljeutslippet til fritidsaktiviteter?

Du kan krysse av for flere alternativer

- ☐ Ja, berørt område for liten miljøskade
- ☐ Ja, berørt område for middels miljøskade
- ☐ Ja, berørt område for stor miljøskade
- ☐ Ja, berørt område for svært stor miljøskade
- ☒ Nei, har ikke benyttet noen av de berørte områdene


Liten miljøskade


Tenk deg først at uten nye tiltak, vil det i løpet av de nærmeste årene skje ett skipsuhell med oljeutslipp som forårsaker liten miljøskade i kystområdet utenfor Florø. Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne miljøskaden som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak	Uten tiltak			
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning I alt 1500 døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter 1 år I alt 12500 døde fugl	Bestanden av ærfugl lokalt utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 2 år I alt 30 000 døde fugl	Bestanden av ærfugl og lomst lokalt utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 4 år I alt 70 000 døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt 30 døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt 100 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter 2 år I alt 300 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe lokalt utryddingstruet I alt 500 døde sel
Skade på kystsone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har verdifullt naturmiljø	5 km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 6 måneder	30 km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 1 år	150 km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 3 år	400 km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 5 år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat etter 1 år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 3 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 5 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir liten miljøskade

■ Viktige friluftsområder





TESTMODE

q12

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én liten miljøskade i kystområdet utenfor Florø?


Næringslivet, skipsfarten, staten og husstandene drar alle nytte av skipstrafikken, og alle parter må derfor betale for tiltakene som gjør at man unngår miljøskader fra oljeutslipp. Alle husstander i regionen må dekke sin del av kostnadene gjennom økt inntektsskatt som går uavkortet til Kystverket for å bedre oljevernberedskapen.

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for å gjennomføre tiltak slik at man unngår en liten miljøskade i kystområdet utenfor Florø? Husk at dersom husstanden din betaler for dette, blir det mindre penger igjen å bruke på andre ting.

Tenk på hva det er verdt for deg og din husstand å unngå én liten miljøskade i kystområdet utenfor Florø.

I glideskalaen nedenfor, velg det høyeste beløpet, om noe, din husstand helt sikkert er villig til å betale per år i 10 år.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:



i12

Tilsvare totalt i 10 år:

1000 kroner




Middels miljøskade


Tenk deg nå istedenfor at uten tiltak vil det skje ett skipsuhell med oljeutslipp som gir middels miljøskade i kystområdet utenfor Florø , som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak		Uten tiltak		
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning I alt <u>1500</u> døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter <u>1</u> år I alt <u>12500</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl lokalt utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>2</u> år I alt <u>30 000</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl og lomvi lokalt utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>4</u> år I alt <u>70 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt <u>30</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt <u>100</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter <u>2</u> år I alt <u>300</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe lokalt utryddingstruet. I alt <u>500</u> døde sel
Skade på kystsone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har verdifullt naturmiljø	<u>5</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat etter <u>1</u> år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir middels miljøskade

■ Viktige friluftsområder





TESTMODE


q13

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én middels miljøskade i kystområdet utenfor Florø ?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én middels miljøskade i kystområdet utenfor Florø ?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor; ikke i tillegg til, beløpet du oppga tidligere for å unngå liten miljøskade.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:



i13

Tilsvare totalt i 10 år:

1000 kroner




Tenk deg nå at dersom det ikke gjennomføres tiltak skjer det istedenfor et skipsuhell med oljeutslipp som gir stor miljøskade i kystområdet utenfor Florø .


Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne miljøskaden, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak			Uten tiltak	
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter <u>1</u> år I alt <u>12500</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokalt</u> utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>2</u> år I alt <u>30 000</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl og lomvi <u>lokalt</u> utryddingstruet Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>4</u> år I alt <u>70 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning	Selbestandene i god forfatning	Selbestandene i god forfatning	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter <u>2</u> år I alt <u>300</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokalt</u> utryddingstruet I alt <u>500</u> døde sel
Skade på kystzone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har verdifullt naturmiljø	<u>5</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjemat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjemat etter <u>1</u> år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir stor miljøskade

 Viktige friluftsområder





TESTMODE

q14

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én stor miljøskade i kystområdet utenfor Florø ?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én stor miljøskade i kystområdet utenfor Florø ?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor de beløpene du oppga tidligere.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

A horizontal slider bar with a light blue background. A green arrow points to the 1100 mark on the scale above it.

i14

Tilsvare totalt i 10 år:

11000 kroner



Svært stor miljøskade


Tenk deg nå istedenfor at dersom det ikke gjennomføres tiltak skjer det ett skipsuhell med oljeutslipp som gir svært stor miljøskade i kystområdet utenfor Florø .


Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne ene miljøskaden, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak				Uten tiltak
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i god forfatning I alt <u>1500</u> døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter <u>1</u> år I alt <u>12500</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokalt</u> utrydningstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>2</u> år I alt <u>30 000</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl og lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>4</u> år I alt <u>70 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt <u>30</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt <u>100</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter <u>2</u> år I alt <u>300</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokalt</u> utrydningstruet. I alt <u>500</u> døde sel
Skade på kystsone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv Området har verdifullt naturmiljø	<u>5</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat etter <u>1</u> år Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir svært stor miljøskade

 Viktige friluftsområder





TESTMODE

qNew

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én svært stor miljøskade i kystområdet utenfor Florø?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én svært stor miljøskade i kystområdet utenfor Florø?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor de beløpene du oppga tidligere.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

A horizontal slider bar with a green arrow pointing to the value 1800 in the table above. The bar is light blue and has a thin line running through it.

iNew

Tilsvaret totalt i 10 år:

18000 kroner




I denne undersøkelsen skal vi se spesielt på tiltak mot oljeutslipp fra skipsulykker utenfor Vestlandskysten, dvs. hav- og kystområdene utenfor Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal (se kartet nedenfor).

Vestlandskysten



Omtrent hvor langt er det fra sjøen (saltvann) i luftlinje til din bolig?

- ☐ 0-500 meter
- ☐ 500 – 999 meter
- ☐ 1- 3 kilometer
- ☐ 4 - 9 kilometer
- ☐ 10-29 kilometer
- ☐ 30-59 kilometer



TESTMODE

q8


Hvis det ikke settes inn flere tiltak for å styrke oljevernberedskapen, mener eksperter at det vil skje en skipsulykke med oljeutslipp som gir miljøskade langs Vestlandskysten de nærmeste årene.

Et slikt utslipp vil påvirke dyre- og plantelivet (se bildene nedenfor), og redusere mulighetene for friluftsliv i en periode. De to fugleartene lomvi og ærfugl er vist spesielt fordi de er sårbare arter. Fisk klarer oftest å svømme unna utslippet.



Hvor godt vil du si at du kjenner til plante- og dyrelivet på Vestlandskysten?

Ikke i det hele tatt	Lite	Middels	Ganske godt	Meget godt
☐	☐	☐	☐	☐



TESTMODE

i9a

Olje som slippes ut vil både flyte på sjøen, blandes i vannet og kunne drive på land. Det vil påvirke hvor fint det er å bade, være ute i båt, gå tur og gjøre andre aktiviteter. Bildene nedenfor er eksempler fra området.



Miljøskader på Vestlandskysten med og uten tiltak

Tabellen viser dagens miljøtilstand på Vestlandskysten (i grønt) og hvordan miljøet kan ta skade som følge av oljeutslipp fra en skipsulykke. Skal dagens tilstand bevares er det nødvendig å innføre ulike tiltak.

Vi vil gjerne vite hva det er verdt for deg og din husstand å unngå disse miljøskadene.

Bruk gjerne litt tid på å lese tabellen.

	Med tiltak	Uten tiltak			
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning.	Fuglebestandene i god forfatning. I alt 1500 døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter 1 år. I alt 12 500 døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokal</u> t utrydningstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 2 år. I alt 30 000 døde fugl	Bestanden av ærfugl og lomvi <u>lokal</u> t utrydningstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 4 år. I alt 70 000 døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning.	Selbestandene i god forfatning. I alt 30 døde sel	Selbestandene i god forfatning. I alt 100 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter 2 år. I alt 300 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokal</u> t utrydningstruet. I alt 500 døde sel
Skade på kystsone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv. Området har verdifullt naturmiljø.	5 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter 6 måneder	30 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter 1 år	150 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter 3 år	400 km kystsone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter 5 år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat etter 1 år. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 3 år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 5 år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

TESTMODE

q10

Hvilke av disse fire typene miljøskader er viktigst for deg?

Rangér skadene på fugl, sel, på kystsone og på livet ellers i sjøen. Dra bildene over i boksene i den rekkefølgen som er viktigst for deg. Du kan flytte på bildene etter at de er plassert.

Skade på fugl



Skade på sel



Skade på kystsone



Skade på annet liv i sjøen



1

2

3


4



Kartet nedenfor viser et område utenfor Bergen, eller nærmere bestemt; området nord for Austevoll og sør for Bergen der det er mye skipstrafikk, og et mulig ulykkespunkt er vist som en rød prikk. Sirkene/skraveringen viser hvor langt oljen kan spre seg.

Spredning av olje som gir liten, middels, stor og svært stor miljøskade


- Viktige områder for biologisk mangfold
- Viktige friluftsområder



Har du de siste 12 månedene benyttet noen av områdene markert på kartet som ville bli skadet av dette oljeutslippet til fritidsaktiviteter?

Du kan krysse av for flere alternativer

- ☐ Ja, berørt område for liten miljøskade
- ☐ Ja, berørt område for middels miljøskade
- ☐ Ja, berørt område for stor miljøskade
- ☐ Ja, berørt område for svært stor miljøskade
- ☐ Nei, har ikke benyttet noen av de berørte områdene



TESTMODE

q12

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én liten miljøskade i kystområdet utenfor Bergen?

Næringslivet, skipsfarten, staten og husstandene drar alle nytte av skipstrafikken, og alle parter må derfor betale for tiltakene som gjør at man unngår miljøskader fra oljeutslipp. Alle husstander i regionen må dekke sin del av kostnadene gjennom økt inntektsskatt som går uavkortet til Kystverket for å bedre oljevernberedskapen.

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for å gjennomføre tiltak slik at man unngår en liten miljøskade i kystområdet utenfor Bergen? Husk at dersom husstanden din betaler for dette, blir det mindre penger igjen å bruke på andre ting.

Tenk på hva det er verdt for deg og din husstand å unngå én liten miljøskade i kystområdet utenfor Bergen.

I glideskalaen nedenfor, velg det høyeste beløpet, om noe, din husstand helt sikkert er villig til å betale per år i 10 år.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

A horizontal slider bar with a blue track and a green arrow pointing to the 1100 mark. The track is labeled with the values from the table above.

i12

Tilsvare totalt i 10 år:

11000 kroner




Liten miljøskade

Tenk deg først at uten nye tiltak, vil det i løpet av de nærmeste årene skje ett skipsuhell med oljeutslipp som forårsaker liten miljøskade i kystområdet utenfor Bergen.
Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne miljøskaden som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak	Uten tiltak			
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning.	Fuglebestandene i god forfatning. I alt 1500 døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter 1 år. I alt 12 500 døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokalt</u> utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 2 år. I alt 30 000 døde fugl	Bestanden av ærfugl og fennvik <u>lokalt</u> utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter 4 år. I alt 70 000 døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning.	Selbestandene i god forfatning. I alt 30 døde sel	Selbestandene i god forfatning. I alt 100 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter 2 år. I alt 300 døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokalt</u> utryddingstruet. I alt 500 døde sel
Skade på kystzone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv. Området har verdifullt naturmiljø.	5 km kystzone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter 6 måneder	30 km kystzone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter 1 år	150 km kystzone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter 3 år	400 km kystzone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter 5 år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skaldyr i området	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat etter 1 år. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skaldyr, skjell og tang bør ikke spises før 3 år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skaldyr, skjell og tang bør ikke spises før 5 år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir liten miljøskade

- Viktige områder for biologisk mangfold
- Viktige friluftsområder




Middels miljøskade


Tenk deg nå istedenfor at uten tiltak vil det skje ett skipsuhell med oljeutslipp som gir middels miljøskade kystområdet utenfor Bergen, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak		Uten tiltak		
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning.	Fuglebestandene i god forfatning. I alt <u>1500</u> døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter <u>1</u> år. I alt <u>12 500</u> døde fugl	Bestanden av sjøfugl lokalt utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>2</u> år. I alt <u>30 000</u> døde fugl	Bestanden av sjøfugl og landfugl lokalt utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>4</u> år. I alt <u>70 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning.	Selbestandene i god forfatning. I alt <u>30</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning. I alt <u>100</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter <u>2</u> år. I alt <u>300</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe lokalt utryddingstruet. I alt <u>500</u> døde sel
Skade på kystzone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv. Området har verdifullt naturmiljø.	<u>5</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat etter <u>1</u> år. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket

Spredning av olje som gir middels miljøskade

- Viktige områder for biologisk mangfold
- Viktige friluftsområder





TESTMODE

q13

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én middels miljøskade i kystområdet utenfor Bergen?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én middels miljøskade i kystområdet utenfor Bergen?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor; ikke i tillegg til, beløpet du oppga tidligere for å unngå liten miljøskade.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

A horizontal slider bar with a light blue background. A green arrow points to the 1800 mark on the scale above.

i13

Tilsvarer totalt i 10 år:

18000 kroner




Tenk deg nå at dersom det ikke gjennomføres tiltak skjer det istedenfor et skipsuhell med oljeutslipp som gir stor miljøskade i kystområdet utenfor Bergen.


Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne miljøskaden, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak			Uten tiltak	
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning.	Fuglebestandene i god forfatning.	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter <u>1</u> år.	Bestanden av ærfugl <u>lokalt</u> utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>2</u> år.	Bestanden av ærfugl og <u>lønvi</u> <u>lokalt</u> utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>4</u> år.
		I alt <u>1500</u> døde fugl.	I alt <u>12 500</u> døde fugl.	I alt <u>30 000</u> døde fugl.	I alt <u>70 000</u> døde fugl.
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning.	Selbestandene i god forfatning.	Selbestandene i god forfatning.	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter <u>2</u> år.	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokalt</u> utryddingstruet.
		I alt <u>30</u> døde sel.	I alt <u>100</u> døde sel.	I alt <u>300</u> døde sel.	I alt <u>500</u> døde sel.
Skade på kystsone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv. Området har verdifullt naturmiljø.	<u>5</u> km kystsone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder.	<u>30</u> km kystsone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år.	<u>150</u> km kystsone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år.	<u>400</u> km kystsone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år.
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området.	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket.	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat etter <u>1</u> år. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket.	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket.	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket.

Spredning av olje som gir stor miljøskade

- Viktige områder for biologisk mangfold
- Viktige friluftsområder





TESTMODE


q14

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én stor miljøskade i kystområdet utenfor Bergen?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én stor miljøskade i kystområdet utenfor Bergen?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor de beløpene du oppga tidligere.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:



i14

Tilsvare totalt i 10 år:

18000 kroner



Svært stor miljøskade

Tenk deg nå istedenfor at dersom det ikke gjennomføres tiltak skjer det ett skipsuhell med oljeutslipp som gir svært stor miljøskade i kystområdet utenfor Bergen.


Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne ene miljøskaden, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak				Uten tiltak
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl de siste årene, men fuglebestandene i hovedsak i god forfatning.	Fuglebestandene i god forfatning. I alt <u>1500</u> døde fugl	Fuglebestandene tilbake i god tilstand etter <u>1</u> år. I alt <u>12 500</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl <u>lokal</u> utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>2</u> år. I alt <u>30 000</u> døde fugl	Bestanden av ærfugl og lomvi <u>lokal</u> utryddingstruet. Øvrige fuglebestander tilbake i god tilstand etter <u>4</u> år. I alt <u>70 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Deler av området er viktig for sel. Selbestanden er i god forfatning.	Selbestandene i god forfatning. I alt <u>30</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning. I alt <u>100</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe tilbake til normalt nivå etter <u>2</u> år. I alt <u>300</u> døde sel	Bestanden av seltypen steinkobbe <u>lokal</u> utryddingstruet. I alt <u>500</u> døde sel
Skade på kystsone					
	Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv. Området har verdifullt naturmiljø.	<u>5</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder.	<u>30</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år.	<u>150</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år.	<u>400</u> km kystsone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje. Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv. Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år.
Skade på annet liv i sjøen					
	Fisk og skalldyr i området	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket.	Kan høstes som før. Trygt å spise sjømat etter <u>1</u> år. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket.	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises for <u>3</u> år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket.	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises for <u>5</u> år etter utslippet. Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket.

Spredning av olje som svært stor miljøskade

- Viktige områder for biologisk mangfold
- Viktige friluftsområder





TESTMODE


qNew

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én svært stor miljøskade i kystområdet utenfor Bergen?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én svært stor miljøskade i kystområdet utenfor Bergen?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor de beløpene du oppga tidligere.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:



iNew


Tilsvaret totalt i 10 år:

5000 kroner




I denne undersøkelsen skal vi se spesielt på tiltak mot oljeutslipp fra skipsulykker utenfor kysten av Nord-Norge, dvs. hav- og kystområdene utenfor Nordland, Troms og Finnmark (se kartet nedenfor).

Kysten av Nordland, Troms og Finnmark



Omtrent hvor langt er det fra sjøen (saltvann) i luftlinje til din bolig?

- ☐ 0-500 meter
- ☐ 500 – 999 meter
- ☐ 1- 3 kilometer
- ☐ 4 - 9 kilometer
- ☐ 10-29 kilometer
- ☐ 30-59 kilometer
- ☐ 60-99 kilometer
- ☐ 100-200 kilometer
- ☐ Mer enn 200 kilometer
- ☐ Usikker/vet ikke




TESTMODE

q3

Har du (dvs. eier eller disponerer) hytte ved kysten av Nord-Norge (i fylkene Nordland, Troms og Finnmark) ?

- ☐ Ja, har hytte langs kysten av Nordland
- ☐ Ja, har hytte langs kysten av Troms
- ☐ Ja, har hytte langs kysten av Finnmark
- ☐ Nei, har hytte på kysten, men ikke på denne strekningen
- ☐ Nei, har ikke hytte ved kysten
- ☐ Usikker/vet ikke






TESTMODE

q4

Har du de siste 12 månedene benyttet kysten av Nord-Norge til noen av de følgende fritidsaktivitetene?

- ☐ Surfing, padling eller dykking
- ☐ Båttur (uten å fiske)
- ☐ Sanke skjell, tang eller fange krabber
- ☐ Bading
- ☐ Jakt på sjøfugl og sel
- ☐ Fritidsfiske fra båt
- ☐ Fritidsfiske med stang fra land
- ☐ Fotografering eller maling
- ☐ Kikke på fugle- og dyreliv
- ☐ Gå turer eller jogge langs sjøen
- ☐ Andre aktiviteter; i tilfelle hva
- ☐ Ingen aktivitet
- ☐ Vet ikke





TESTMODE


qxNY

Omtrent hvor mange dager de siste 12 månedene benyttet du andre deler av norskekysten (ikke Nord-Norge) til fritidsaktiviteter?

Du kan regne en aktivitet som varte én time eller mer som én dag. Om du gjorde flere aktiviteter samme dag teller dette kun som én dag

- ☐ 0 dager
- ☐ 1-5 dager
- ☐ 6-15 dager
- ☐ 16-30 dager
- ☐ 31-50 dager
- ☐ 51-100 dager
- ☐ Flere enn 100 dager
- ☐ Usikker/vet ikke





TESTMODE


q8
Hvis det ikke settes inn flere tiltak for å styrke oljevernberedskapen, mener eksperter at det vil skje en skipsulykke med oljeutslipp som gir miljøskade langs kysten av Nord-Norge i de nærmeste årene.

Et slikt utslipp vil påvirke dyre- og plantelivet (se bildene nedenfor), og redusere mulighetene for friluftsliv i en periode. De to fugleartene lomvi og krykkje er vist spesielt fordi de er sårbare arter. Fisk klarer oftest å svømme unna utslippet.



Hvor godt vil du si at du kjenner til plante- og dyrelivet på kysten av Nord-Norge?

Ikke i det hele tatt	Lite	Middels	Ganske godt	Meget godt
☐	☐	☐	☐	☐

**TESTMODE**

i9a

Olje som slippes ut vil både flyte på sjøen, blandes i vannet og kunne drive på land. Det vil påvirke hvor fint det er å bade, være ute i båt, gå tur og gjøre andre aktiviteter. Bildene nedenfor er eksempler fra området.



Miljøskader i Vestfjorden/Lofoten-området i Nordland med og uten tiltak

Vi skal nå se på Vestfjorden/Lofoten-området i Nordland. Dette er et område der det er mye skipstrafikk. Tabellen viser dagens miljøtilstand i Vestfjorden/Lofoten (i grønt) og hvordan miljøet kan ta skade som følge av oljeutslipp fra en skipsulykke i dette området (kart vises i senere skjerm bilde). Skal dagens tilstand bevares er det nødvendig å innføre ulike tiltak.

Vi vil gjerne vite hva det er verdt for deg og din husstand å unngå disse miljøskadene.

Bruk gjerne litt tid på å lese tabellen.

	Med tiltak	Uten tiltak			
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl siste år, men bestander i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i hovedsak i god forfatning I alt 1500 døde fugl	Lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter 1 år I alt 15 000 døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter 2 år I alt 50 000 døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>utrydningstruet i Norge</u> Øvrige bestander tilbake til normalt etter 4 år I alt 120 000 døde fugl
Skade på sel					
	Området er viktig for sel. Selbestandene i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt 30 døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt 100 døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>lokalt</u> utrydningstruet I alt 500 døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>utrydningstruet i Norge</u> Øvrige arter tilbake til normalt etter 4 år I alt 1000 døde sel
Skade på kystsone					
	Rikt ravinelandskap og dypvanns koraller Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv for fastboende og tilreisende	5 km kystsone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 6 måneder	30 km kystsone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 1 år	150 km kystsone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 3 år	400 km kystsone bestående av <u>svaberg</u> og <u>strender</u> og fiskevær tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 5 år
Skade på annet liv i sjøen					
	Området er viktig gyte- og internasjonalt viktig oppvekst- og beiteområde for flere fiskeslag	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter 1 år	Fisk, skaldyr, skjell og tang bør ikke spises før 3 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter 3 år	Fisk, skaldyr, skjell og tang bør ikke spises før 5 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter 5 år



TESTMODE

q10

Hvilke av disse fire typene miljøskader er viktigst for deg?

Rangér skadene på fugl, sel, på kystsone og på livet ellers i sjøen. Dra bildene over i boksene i den rekkefølgene som er viktigst for deg. Du kan flytte på bildene etter at de er plassert.

Skade på fugl



Skade på sel



Skade på kystsone



Skade på annet liv i sjøen



1

2

3


4



q10b

Kartet nedenfor viser Vestfjorden/Lofoten-området, det vil si havområdet og kysten som ligger mellom ytterspissen av Lofoten i nord-vest, Bodø i sør og Lødingen i nord-øst. Et mulig punkt for en skipsulykke er vist som en rød prikk. Sirklene/skraveringen viser hvor langt oljen kan spre seg.

Spredning av olje som gir liten, middels, stor og svært stor miljøskade



Har du de siste 12 månedene benyttet noen av områdene markert på kartet som ville bli skadet av dette oljeutslippet til fritidsaktiviteter?

Du kan krysse av for flere alternativer

- ☐ Ja, berørt område for liten miljøskade
- ☐ Ja, berørt område for middels miljøskade
- ☐ Ja, berørt område for stor miljøskade
- ☐ Ja, berørt område for svært stor miljøskade
- ☐ Nei, har ikke benyttet noen av de berørte områdene

Liten miljøskade


Tenk deg først at uten nye tiltak, vil det i løpet av de nærmeste årene skje ett skipsuhell med oljeutslipp som forårsaker liten miljøskade i Vestfjorden-området. Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne miljøskaden som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak	Uten tiltak			
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl siste år, men bestander i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i hovedsak i god forfatning I alt 1500 døde fugl	Lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter 1 år I alt 15 000 døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter 2 år I alt 50 000 døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>utrydningstruet</u> Øvrige bestander tilbake til normalt etter 4 år I alt 120 000 døde fugl
Skade på sel					
	Området er viktig for sel. Selbestandene i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt 30 døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt 100 døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>lokalt</u> utrydningstruet I alt 500 døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>utrydningstruet</u> i Norge Øvrige arter tilbake til normalt etter 4 år I alt 1000 døde sel
Skade på kystzone					
	Rikt ravinelandskap og dypvanns koraller Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv for fastboende og tilreisende	5 km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 6 måneder	30 km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 1 år	150 km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 3 år	400 km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> og <i>flak</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter 5 år
Skade på annet liv i sjøen					
	Området er viktig gyte- og internasjonalt viktig oppvekst- og beiteområde for flere fiskeslag	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter 1 år	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 3 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter 3 år	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før 5 år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter 5 år

Spredning av olje som gir liten miljøskade

-  Naturvernområder
-  Viktige friluftsområder





TESTMODE

q12

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én liten miljøskade i Vestfjorden?

Næringslivet, skipsfarten, staten og husstandene drar alle nytte av skipstrafikken, og alle parter må derfor betale for tiltakene som gjør at man unngår miljøskader fra oljeutslipp. Alle husstander i regionen må dekke sin del av kostnadene gjennom økt inntektsskatt som går uavkortet til Kystverket for å bedre oljevernberedskapen.

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for å gjennomføre tiltak slik at man unngår en liten miljøskade i Vestfjorden? Husk at dersom husstanden din betaler for dette, blir det mindre penger igjen å bruke på andre ting.

Tenk på hva det er verdt for deg og din husstand å unngå én liten miljøskade i Vestfjorden-området.

I glideskalaen nedenfor, velg det høyeste beløpet, om noe, din husstand helt sikkert er villig til å betale per år i 10 år.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

A horizontal slider bar with a light blue background and a darker blue track. A green arrow icon is positioned at the far left, corresponding to the '0' value in the table above.



Middels miljøskade


Tenk deg nå istedenfor at uten tiltak vil det skje ett skipsuhell med oljeutslipp som gir middels miljøskade i Vestfjorden-området, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak		Uten tiltak		
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl siste år, men bestander i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i hovedsak i god forfatning I alt <u>1500</u> døde fugl	Lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter <u>1</u> år I alt <u>15 000</u> døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter <u>2</u> år I alt <u>50 000</u> døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet i Norge Øvrige bestander tilbake til normalt etter <u>1</u> år I alt <u>120 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Området er viktig for sel. Selbestandene i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt <u>30</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt <u>100</u> døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>lokalt</u> utrydningstruet I alt <u>500</u> døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>lokalt</u> utrydningstruet i Norge Øvrige arter tilbake til normalt etter <u>4</u> år I alt <u>1000</u> døde sel
Skade på kystzone					
	Rikt ravinelandskap og dypvanns koraller Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv for fastboende og tilreisende	<u>5</u> km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystzone bestående av <i>svaberg</i> og <i>strender</i> og <i>friluftsliv</i> tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Området er viktig gyte- og internasjonalt viktig oppvekst- og beiteområde for flere fiskeslag.	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter <u>1</u> år	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter <u>3</u> år	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter <u>5</u> år

Spredning av olje som gir middels stor miljøskade

-  Naturvernområder
-  Viktige friluftsområder





TESTMODE

q13

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én middels miljøskade i Vestfjorden?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én middels miljøskade i Vestfjorden?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor; ikke i tillegg til, beløpet du oppga tidligere for å unngå liten miljøskade.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

A horizontal slider bar with a green arrow pointing to the value 25 in the table above.

i13

Tilsvare totalt i 10 år:

250 kroner



Tenk deg nå at dersom det ikke gjennomføres tiltak skjer det istedenfor et skipsuhell med oljeutslipp som gir stor miljøskade i Vestfjorden.


Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne miljøskaden, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak			Uten tiltak	
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl siste år, men bestander i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i hovedsak i god forfatning I alt <u>1500</u> døde fugl	Lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter <u>1</u> år I alt <u>15 000</u> døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter <u>2</u> år I alt <u>50 000</u> døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>lokalt</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter <u>4</u> år I alt <u>120 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Området er viktig for sel. Selbestandene i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt <u>30</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt <u>100</u> døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>lokalt</u> utrydningstruet I alt <u>500</u> døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>lokalt</u> utrydningstruet i Norge Øvrige etter tilbake til normalt etter <u>4</u> år I alt <u>1000</u> døde sel
Skade på kystzone					
	Rikt ravinelandskap og dypvanns koraller Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv for fastboende og tilreisende	<u>5</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystzone bestående av svaberg og strender og fiskevann tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Området er viktig gyte- og internasjonalt viktig oppvekst- og beiteområde for flere fiskeslag	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter <u>1</u> år	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter <u>3</u> år	Fisk, skalldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter <u>5</u> år

Spredning av olje som gir stor miljøskade

- Naturvernområder
- Viktige friluftsområder





TESTMODE

q14
Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én stor miljøskade i Vestfjorden?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én stor miljøskade i Vestfjorden?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor de beløpene du oppga tidligere.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:

0	25	50	100	300	500	700	900	1100	1400	1800	2200	2700	3200	3800	4400	5100	5800	7000	8500	10000	13000	15000	Mer enn 15000	Vet ikke
---	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	---------------	----------

A horizontal slider bar with a green arrow pointing to the 1100 mark. The bar is light blue and has a thin black line running through it.

i14
Tilsvare totalt i 10 år:
11000 kroner



Svært stor miljøskade

Tenk deg nå istedenfor at dersom det ikke gjennomføres tiltak skjer det ett skipsuhell med oljeutslipp som gir svært stor miljøskade i Vestfjorden.

Dersom det gjennomføres tiltak, vil man unngå denne ene miljøskaden, som vist i tabellen og kartet nedenfor.

	Med tiltak				Uten tiltak
	Dagens tilstand	Liten miljøskade	Middels miljøskade	Stor miljøskade	Svært stor miljøskade
Skade på fugl					
	Området er viktig hekke-, trekk- og overvintringsområde for sjøfugl. Har vært nedgang i sjøfugl siste år, men bestander i hovedsak i god forfatning	Fuglebestandene i hovedsak i god forfatning I alt <u>1500</u> døde fugl	Lomvi <u>lokal</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter <u>1</u> år I alt <u>15 000</u> døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>lokal</u> utrydningstruet Øvrige bestander tilbake til normalt etter <u>2</u> år I alt <u>50 000</u> døde fugl	Bestanden av krykkje og lomvi <u>utrydningstruet i Norge</u> Øvrige bestander tilbake til normalt etter <u>4</u> år I alt <u>120 000</u> døde fugl
Skade på sel					
	Området er viktig for sel. Selbestandene i god forfatning	Selbestandene i god forfatning I alt <u>30</u> døde sel	Selbestandene i god forfatning I alt <u>100</u> døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>lokal</u> utrydningstruet I alt <u>500</u> døde sel	Bestanden av selarten steinkobbe <u>utrydningstruet i Norge</u> Øvrige arter tilbake til normalt etter 4 år I alt <u>1000</u> døde sel
Skade på kystzone					
	Rikt ravinelandskap og dypvanns koraller Området er viktig for rekreasjon og friluftsliv for fastboende og tilreisende	<u>5</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>6</u> måneder	<u>30</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>1</u> år	<u>150</u> km kystzone bestående av svaberg og strender tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>3</u> år	<u>400</u> km kystzone bestående av svaberg og strender og fiskevær tilsølt med olje Påvirker landbasert og vannbasert friluftsliv Berørte områder kan brukes som normalt etter <u>5</u> år
Skade på annet liv i sjøen					
	Området er viktig gyte- og internasjonalt viktig oppvekst- og beiteområde for flere fiskeslag.	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk ikke påvirket	Kan høstes som før Trygt å spise sjømat Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter <u>1</u> år	Fisk, skaldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>3</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter <u>3</u> år	Fisk, skaldyr, skjell og tang bør ikke spises før <u>5</u> år etter utslippet Gyte- og oppvekstområder for fisk tilbake til normalt etter <u>5</u> år

Spredning av olje som gir svært stor miljøskade

-  Naturvernområder
-  Viktige friluftsområder





TESTMODE


qNew

Hva er det verdt for deg og din husstand å unngå én svært stor miljøskade i Vestfjorden?

Hva er det meste, om noe, din husstand helt sikkert vil betale i økt skatt per år de neste 10 årene, for at Kystverket skal gjennomføre tiltak slik at man unngår én svært stor miljøskade i Vestfjorden?

Husk at dette beløpet kommer istedenfor de beløpene du oppga tidligere.

Kroner per år for hvert år i en 10-års periode:



iNew

Tilsvare totalt i 10 år:

250 kroner

